

Instructivo de broncoscopia

- 1- Ayuno de 6 horas, sólido y líquido inclusive. En caso de medicación antihipertensiva, puede tomar a la mañana temprano con un poco de agua.
- 2- **Suspender ASPIRINA** al menos **7 (siete) días** previos al procedimiento (en caso de biopsia trasbronquial).
- 3- **Suspender CLOPIDOGREL** (PLAVIX, NAVRATIN, etc.) al menos **3 (tres) semanas** previas al procedimiento (en caso de biopsia trasbronquial).
- 4- **Suspender ACENOCUMAROL (Sintrom)** al menos **5 (cinco) días** previos al procedimiento (en caso de biopsia trasbronquial).
- 5- **Suspender HEPARINA de bajo peso molecular** al menos **12 (doce) horas** previas al procedimiento (en caso de biopsia trasbronquial).
- 6- **IMPORTANTE: TRAER ESTUDIOS DEL PACIENTE:** Tomografía de tórax, Radiografía (Rx) de tórax, Análisis de sangre (coagulograma), Electrocardiograma (ECG).
- 7- Debe asistir con un acompañante.

Cualquier duda, preguntar al Dr. Alberini (011-15-36631041), o al Dr. Chung (011-15-44012967), o al interno 2985.