



Le solicitamos que no utilicen cremas cerca del sitio de catéter. Esto podría favorecer que se despegue el apósito transparente, dejando el catéter expuesto al ambiente.

Cada 8 días, por más que el catéter se encuentre sin signos de alarma, enfermería realizará una curación para prevenir una posible infección. En ese momento, se valorará además el catéter. No es un procedimiento riesgoso, pero necesitaremos su colaboración. Cuanto más quieto esté su hijo, el procedimiento se hará más rápido (5 minutos o menos).




Debe consultar de inmediato si:

- ↪ Nota que la tubuladura se desconecta.
- ↪ Observa el apósito transparente despegado.
- ↪ Su hijo siente dolor en el área de la piel alrededor del sitio del catéter.
- ↪ Su hijo tiene fiebre de más de (38 ° C).
- ↪ Observa pus que sale del sitio del catéter.
- ↪ Advierte un olor desagradable proveniente del sitio.
- ↪ El área de la piel alrededor del catéter está enrojecida o hinchada. También si la piel alrededor del catéter se siente tibia al tacto.



Catéter venoso NO tunelizado



A su hijo le colocarán un Catéter NO Tunelizado. Aquí encontrará información útil. Aún así, siéntase con libertad de consultar todas sus dudas con el personal de salud.



¿Qué es?

Se trata de un catéter (tubo) de material blando y flexible, que es bien tolerado por el organismo. Es largo y angosto. Una parte del catéter queda dentro de una vena de gran calibre y la otra permanece fuera del cuerpo. Puede tener una, dos o tres ramas.

¿Por qué hay que colocarlo?



Se utiliza para evitar los repetidos pinchazos en diferentes venas, y facilita el tratamiento. Se pueden administrar diferentes medicaciones, si es necesario se puede administrar o sacar sangre.

¿Cómo se coloca?

El cirujano colocará el catéter mientras su hijo se encuentra en el quirófano. Se le administrará un medicamento para ayudarlo a dormir durante el procedimiento.



Puede también colocarlo un médico entrenado en la habitación.

Luego de la colocación es esperable observar inflamación, leve dolor y escaso sangrado.

¿Cuánto dura?

Se utiliza este catéter para tratamiento de varias semanas.

Entonces, mientras mi hijo tenga este catéter, ¿se puede bañar?



Sí se puede, siempre y cuando se tomen precauciones para reducir la posibilidad de introducir organismos en el catéter.

El baño se realizará por arrastre. Se recomienda utilizar paños de clorhexidina.

¿Se puede salir el catéter?

Si, se puede salir. Para evitarlo los médicos colocan puntos de sutura para fijarlo bien. Si usted observa que algún punto se salió, por favor avise a enfermería. Además, se coloca un apósito transparente para evitar el movimiento y prevenir la infección.

Pueden existir complicaciones con este tipo de catéter. Para PREVENIRLAS, usted debe:

☞ asegurarse que sus familiares y amigos se higienicen las manos con agua y jabón, o con un desinfectante de manos a base de alcohol, antes y después de visitar a su hijo.

☞ impedir que las visitas toquen el sitio del catéter. Explicar y controlar al niño que él tampoco debe tocarlo.

☞ Si su hijo usa pañales, asegurarse que el tapón y toda la tubuladura no entre en contacto con el pañal.

☞ impedir que la tubuladura se arrastre por el piso.

☞ observar que el vendaje permanezca limpio y seco.



Puede realizar las actividades diarias (vestirse, comer, caminar, jugar, dormir boca abajo).

Si su hijo desea realizar manualidades (con tijeras u otros elementos) le solicitamos tenga cuidado que no pinche accidentalmente la tubuladura.

