



Le solicitamos que no utilicen cremas cerca del sitio de catéter. Esto podría favorecer que se despegue el apósito transparente, dejando el catéter expuesto al ambiente.

¿Qué pasa si me tengo que ir a mi casa con este catéter?

Cuando no sea necesario utilizarlo continuamente, se puede dejar el mismo intermitente. Para esto, enfermería utilizará heparina antes de "cerrarlo" para evitar la obstrucción del catéter, y que se pueda seguir utilizando. A este procedimiento lo llamamos "sellado". **Enfermería le informará, si es necesario, las fechas en que se debe realizar este procedimiento.**

Mientras esté en su casa, es importante valorar que no se despegue la curación. Igualmente, antes de irse, enfermería repasará con ustedes la técnica de curación.



Debe consultar de inmediato si:


↪ Nota que la tubuladura se desconecta.
↪ Observa el apósito transparente despegado.



- ↪ Su hijo siente dolor en el área de la piel alrededor del sitio del catéter.
- ↪ Su hijo tiene fiebre de más de (38 ° C).
- ↪ Observa pus que sale del sitio del catéter.
- ↪ Advierte un olor desagradable proveniente del sitio.
- ↪ El área de la piel alrededor del catéter está enrojecida o hinchada. También si la piel alrededor del catéter se siente tibia al tacto.



Catéter venoso tunelizado



A su hijo le colocarán un Catéter Tunelizado. Aquí encontrará información útil. Aún así, siéntase con libertad de consultar todas sus dudas con el personal de salud.



¿Qué es?

Se trata de un catéter (tubo) de silicona cuyo extremo se encuentra en una vena del paciente, luego un trayecto del mismo pasa debajo de la piel, y finalmente sale al exterior. Esta parte final del catéter, es la parte visible. Puede tener una, dos o tres ramas.

En el sitio anterior a que el catéter salga, hay un dispositivo llamado "Safe Cuff". Este "tapón" está hecho de un material que evita que el catéter se salga de lugar, y además, previene las infecciones. En este sitio, el equipo de salud colocará un apósito transparente para evitar la infección del catéter.

¿Por qué hay que colocarlo?



Se utiliza para evitar los repetidos pinchazos en diferentes venas, y facilita el tratamiento. Se pueden administrar diferentes medicaciones. Si es necesario, también se podrá administrar o sacar sangre.

¿Cuánto dura?

Se utiliza este catéter para tratamientos prolongados, varios meses.

¿Cómo se coloca?

El cirujano colocará el catéter mientras su hijo se encuentra en el quirófano. Se le administrará un medicamento para ayudarlo a dormir durante el procedimiento. Luego del procedimiento es esperable observar inflamación, leve dolor y escaso sangrado.



Entonces, mientras mi hijo tenga este catéter, ¿se puede bañar?



Sí se puede, siempre y cuando se tomen precauciones para reducir la posibilidad de introducir organismos en el catéter.

El baño se realizará por arrastre. Se recomienda utilizar paños de clorhexidina.

EN CASA: No se debe sumergir el catéter bajo el agua. Cubrirlo, junto a sus dispositivos de conexión, con bolsa o film impermeables.

Pueden existir complicaciones con este tipo de catéter. Para **PREVENIRLAS**, usted debe:

↳ asegurarse que sus familiares y amigos se higienicen las manos con agua y jabón, o con un desinfectante de manos a base de alcohol, antes y después de visitar a su hijo.



↳ impedir que las visitas toquen el sitio del catéter. Explicar y controlar al niño que él tampoco debe tocarlo.

↳ Si su hijo usa pañales, asegurarse que el tapón y toda la tubuladura no entre en contacto con el pañal.

↳ impedir que la tubuladura se arrastre por el piso.

↳ observar que el vendaje permanezca limpio y seco.

Puede realizar las actividades diarias (vestirse, comer, caminar, jugar, dormir boca abajo). **NO DEBE CARGAR PESO EN EL BRAZO DEL CATÉTER.** Evite que el niño realice movimientos bruscos.

↳ Si su hijo desea realizar manualidades (con tijeras u otros elementos) le solicitamos tenga cuidado que no pinche accidentalmente la tubuladura.

