

Lamivudina/Zidovudina (3TC Complex®)

¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?

3TC Complex® es un antirretroviral. Su médico lo puede recetar como profilaxis en accidente cortopunzante o para ayudar a controlar su infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Esto es posible ya que actúa impidiendo que la infección se extienda rápidamente.

Se receta en combinación con otros medicamentos antirretrovirales. Su médico le informará y decidirá qué medicamentos son mejores en su caso. Cada comprimido contiene 300mg de zidovudina (AZT) y 150mg de lamivudina (3TC).

¿QUÉ DEBO COMENTARLE A MI MÉDICO ANTES DE TOMAR 3TC Complex®?

- Si es alérgico a la zidovudina, lamivudina o a algún excipiente.
- Si está o planea quedar embarazada.
- Si está amamantando a un bebe.
- Si sufre trastornos hepáticos o renales.
- Si tiene diabetes.
- Si tiene hemofilia.
- Si está recibiendo: doxorubicina, emtricitabina, ribavirina, estavudina o zalcitabina.
- Si está tomando algún fármaco que tenga alguno de los componentes de 3TC Complex®.
- Toda medicación que consume, sea de venta libre, natural o vitaminas.

¿QUÉ COSAS DEBO SABER O HACER MIENTRAS ESTOY TOMANDO 3TC Complex®?

- Avise que está tomando esta medicación si tiene que atenderse con un médico, enfermero, dentista o farmacéutico.
- Hágase los controles sanguíneos que le indique su médico.
- Este medicamento no reduce el riesgo de transmitir el VIH a otras personas a través del contacto sexual, por compartir agujas o por estar expuestos a su sangre. Los pacientes pueden continuar experimentando enfermedades asociadas a la infección por VIH, incluyendo infecciones oportunistas. No

comparta agujas ni elementos como cepillo de dientes o rasuradores.

- Ud. puede tener más riesgos de infecciones. Lávese las manos con frecuencia. Permanezca alejado de personas con infecciones, resfríos o gripe.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS QUE TENGO QUE COMUNICAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE?

Si bien es raro, algunas personas pueden tener efectos adversos graves asociados a la toma de una medicación. Avise a su médico si Ud. tiene alguno de los siguientes signos o síntomas.

- Signos de una reacción alérgica (rash, urticaria, picazón, inflamación o ampollas en la piel, sibilancias, opresión en el pecho, dificultad para respirar o hablar, ronquido inusual, hinchazón de la boca, cara, labios, lengua o garganta.
- Signos de infección: fiebre, escalofríos, dolor de garganta, dolor de oídos, tos, dolor al orinar, llagas en la boca, heridas que no cicatrizan.
- Signos de problemas en el hígado: orina oscura, cansancio, falta de apetito, dolor de estómago, heces claras, vómitos, coloración amarillenta de la piel o de los ojos.
- Signos de acidosis láctica (niveles altos de ácido láctico en la sangre): sensación de mucha debilidad o cansancio, dolores musculares o calambres, problemas para respirar, dolores estomacales o vómitos, sensación de frío, mareos, ritmo cardíaco rápido o irregular.
- Signos de pancreatitis: fuerte dolor de estómago, fuerte dolor de espalda, fuerte malestar estomacal y vómitos.
- Cambios de humor.
- Sensación anormal de ardor, adormecimiento y hormigueo.
- Hematomas o sangrado inexplicable.
- Sensación de mucho cansancio y debilidad.
- Debilidad muscular.
- Cambios en la grasa corporal.

¿QUÉ OTROS EFECTOS ADVERSOS PUEDE PRODUCIR?

- Dolor de cabeza
- Malestar estomacal, vómitos, diarrea, disminución del apetito.
- Mareos
- Cansancio, debilidad, dificultad para dormir.
- Urticaria, prurito
- Congestión nasal

Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se agrava o no desaparecen.

¿CÓMO SE TOMA?

- Su administración es independiente de la ingesta de alimentos. Debe tomarse todos los días a la misma hora: **1 comp. cada 12 hs.**
- Puede tomarse con las comidas si causa molestias estomacales.

¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?

Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde; si se acuerda cerca de la próxima toma, saltee la dosis omitida y tome la que le corresponde volviendo a la dosificación habitual. **NUNCA TOME DOS DOSIS JUNTAS.** Es importante que respete los tiempos de uso que su médico le indicó.

¿CUÁLES SON LAS PRECAUCIONES QUE DEBO TENER?

Es probable que tenga más posibilidades de contraer infecciones por eso es necesario que se lave las manos frecuentemente y en lo posible mantenerse lejos de personas con infecciones, resfriados o gripes.

¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenga el medicamento en su envase original. Conservar en una habitación sin humedad a temperatura ambiente. Nunca almacenar medicamentos en el baño. Mantener la medicación fuera del alcance de niños y animales.

Si debe descartar la medicación consulte con su médico o farmacéutico como hacerlo.

EN CASO DE SOBREDOSIS:

Hosp. A. Posadas ciudad de Bs.As. tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777

http://www.uptodate.com/contents/zidovudine-and-lamivudine-patient-drug-information?source=search_result&search=lamivudina+zidovudina&selectedTitle=3%7E39

Prospecto 3TC Complex®. Industria Alemana. Venta bajo receta.-