

ACICLOVIR

¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?

El Aciclovir es un medicamento del grupo de los antivirales que se utiliza como profilaxis para evitar infecciones producidas por virus en pacientes inmunosuprimidos, ya que estos son más propensos a sufrir infecciones por bacterias, hongos y virus.

¿CÓMO SE UTILIZA?

- Se debe tomar 2 veces al día.
- La dosis es de 800mg cada 12horas en adultos o 15mg/kg cada 12horas en pediatría.
- La presentación es comprimidos de 800mg y jarabe es de 80mg/ml.
- Su administración es independiente de la ingesta de alimentos. Y debe tomarse todos los días a la misma hora. Tomar con las comidas si causa molestias estomacales.

¿QUÉ PROBLEMAS PUEDE PRODUCIR?

La toma de este medicamento puede generar:

- Malestar estomacal, vómitos, diarrea
- Cefalea, mareos
- Cansancio, debilidad
- Urticaria, prurito
- Problemas renales
- Problemas hepáticos
- Disturbios visuales
- Agitación, alucinaciones, cambios en el modo de actuar

Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se agravan o no desaparecen.

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TENER AL TOMARLO?

Asegúrese de tomar mucho líquido mientras dure el tratamiento, salvo que su médico le haya indicado otra cosa.

¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?

Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde del olvido; si se acuerda cerca de la próxima toma, saltee la dosis omitida y tome la que le corresponde volviendo a la dosificación habitual. **NUNCA TOME DOS DOSIS JUNTAS.** Es importante que respete los tiempos de uso que su médico le indicó.

¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenga el medicamento en su envase original. Conservar en una habitación sin humedad a temperatura ambiente. Mantener la medicación fuera del alcance de niños y animales. Si debe descartar la medicación consulte con su médico o farmacéutico como hacerlo.

<http://www.uptodate.com/contents/acyclovir-systemic-drug-information>