

### ITRACONAZOL

#### ¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?

El itraconazol es un antimicótico que se usa en el tratamiento y profilaxis de infecciones producidas por hongos. Existe en el mercado en forma de cápsulas, comprimidos de 100 mg y 200 mg y en jarabe de 10ml/ml (Sporanox®).

#### ¿QUÉ DEBO AVISAR AL MÉDICO ANTES DE TOMAR ITRACONAZOL?

- Si Ud es alérgico al itraconazol o a algún excipiente.
- Si Ud. está en tratamiento por infección en las uñas.
- Si está embarazada o planea estarlo.
- Todos los medicamentos o productos naturales que esté tomando.

#### ¿QUÉ COSAS DEBO SABER O HACER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ITRACONAZOL?

- Avise que está tomando esta medicación si tiene que atenderse con un médico, enfermero, dentista o farmacéutico.
- Evite conducir o realizar tareas que requieran atención hasta no ver cómo lo afecta esta medicación.
- Si tiene mareos o cambios en la visión no conduzca o realice tareas que puedan ser inseguras.
- Hágase los controles sanguíneos que le indique su médico.
- Si tiene altos niveles de azúcar en la sangre (diabetes), consulte a su médico. Esta medicación puede bajar el azúcar en la sangre (hipoglucemia); Ud. puede necesitar una modificación en los fármacos que utiliza para controlar la glucemia.
- No cambie de marca ni de presentación (cápsulas, comprimidos, solución) a menos que se lo indique el médico.
- El itraconazol puede interactuar con muchos fármacos. Esto puede afectar su eficacia o puede producir efectos adversos. Asegúrese de que su médico o farmacéutico conozcan toda la medicación que Ud. toma.
- Ud. puede quemarse con el sol con más facilidad. Evite el sol, lámparas y camas

solares. Utilice pantallas solares, ropa y anteojos que lo protejan del sol.

- Consulte a su médico antes de tomar alcohol.
- Si es mayor de 65 años utilice este medicamento con precaución ya que puede tener más efectos adversos.
- Consulte a su médico si está embarazada o planea estarlo para hablar de los riesgos y beneficios de usar este fármaco durante el embarazo.
- Consulte a su médico si está amamantando para conocer los riesgos que puede producir a su bebé.

#### ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS QUE TENGO QUE COMUNICAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE?

Si bien es raro, algunas personas pueden tener efectos adversos graves asociados a la toma de una medicación. Avise a su médico si Ud. tiene alguno de los siguientes signos o síntomas.

- Signos de una reacción alérgica: rash, urticaria, picazón, inflamación o ampollas en la piel, sibilancias, opresión en el pecho, dificultad para respirar o hablar, ronquido inusual, hinchazón de la boca, cara, labios, lengua o garganta.
- Signos de bajos niveles de potasio en sangre: dolor muscular o debilidad, calambres, latidos cardíacos anormales.
- Signos de problemas en el páncreas (pancreatitis): fuerte dolor de estómago, fuerte dolor de espalda, malestar estomacal y vómitos.
- Signos de problemas en el hígado: orina oscura, cansancio, falta de apetito, dolor de estómago, heces claras, vómitos, coloración amarillenta de la piel o de los ojos.
- Sensación anormal de ardor, adormecimiento y hormigueo.
- Orina con sangre o cambios en la frecuencia para orinar y en la cantidad orinada.
- Cambios en su capacidad sexual.
- Dolor u opresión en el pecho, latidos cardíacos acelerados.
- Fuertes mareos o desmayos.
- Fiebre, resfriado, dolor de garganta.
- Dolor y agrandamiento de los pechos.
- Sangrado o hematomas inexplicables.

- Dolor en las articulaciones.
- Zumbido en los oídos.
- Caída del cabello.
- Depresión.
- Dificultad para dormir.
- Boca seca, dificultad al tragar.
- Inestabilidad.
- Ojos secos, cambios en la visión.

### ¿QUÉ OTROS EFECTOS ADVERSOS PUEDE PRODUCIR EL ITRACONAZOL?

- Dolor de cabeza, mareos.
- Diarrea o heces más líquidas, gases.
- Dolor de barriga. Malestar estomacal o vómitos.
- Secreción nasal y síntomas de resfriado.
- Gusto desagradable en su boca.

Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se agravan o no desaparecen.

### ¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TENER AL TOMARLO?

El itraconazol puede causar efectos secundarios a nivel cardíaco, por ello es de vital importancia que usted le refiera a su médico patologías previas o cualquier reacción adversa provocada por el fármaco.

No tome itraconazol si está tomando alguno de estos medicamentos: Cisapride, eplerenona, ergonovina, ergotamina, felodipina, irinotecan, ivabradina, lovastatina, metadona, metilergonovina, midazolam oral, quinidina, simvastatina, ticagrelor. Tomarlos con itraconazol puede producirle efectos graves y en algunos casos problemas cardíacos mortales. Consulte a su médico.

Si tiene problemas renales o hepáticos no tome itraconazol si está tomando solifenacina o colchicina.

### ¿CÓMO SE TOMA?

La dosis habitual en adultos es de 200mg cada 12 hs, pero puede variar según la concentración en sangre o según sea su indicación para tratamiento o profilaxis. En pacientes pediátricos se usa de 2.5 a 10 mg/kg/día.

Espaciar 2 hs de la toma de antiácidos.  
CÁPSULAS/COMPRIMIDOS: deben ingerirse junto con las comidas. Pueden tomarse con bebidas cola para mejorar la absorción.  
SOLUCIÓN: debe ingerirse con el estómago vacío, 1 hora antes de las comidas o 2 horas después de ingerir alimentos.

### ¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?

Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde; si se acuerda cerca de la próxima toma, saltee la dosis omitida y tome la que le corresponde volviendo a la dosificación habitual. **NUNCA TOME DOS DOSIS JUNTAS.** Es importante que respete los tiempos de uso que su médico le indicó.

### ¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenga el medicamento en su envase original. Conservar en una habitación sin humedad a temperatura ambiente. Mantener la medicación fuera del alcance de niños y animales. Nunca tome medicamentos vencidos. Si debe descartar la medicación consulte con su médico o farmacéutico como hacerlo.

<https://www.uptodate.com/contents/itraconazole-patient-drug-information?>