

Lopinavir/Ritonavir (KALETRA®)

¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?

KALETRA® es un antirretroviral que actúa contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) impidiendo que la infección se extienda rápidamente.

Se usa como profilaxis en accidentes cortopunzantes o para ayudar a controlar la infección por VIH. Se receta en combinación con otros medicamentos antirretrovirales. Su médico le informará y decidirá qué medicamentos son mejores en su caso.

¿QUÉ DEBO COMENTARLE A MI MÉDICO ANTES DE TOMAR KALETRA®?

- Si es alérgico al lopinavir, ritonavir o a algún excipiente.
- Si tiene QT prolongado en el electrocardiograma o si tiene bajos niveles de potasio.
- Si está o planea quedar embarazada.
- Si está tomando alguna medicación que no debería tomar durante el tratamiento con KALETRA®, como ser: algunos fármacos para bajar el colesterol, tratamiento de migrañas, tratamiento de problemas anímicos.
- Si está tomando alguna medicación que le produzca un latido cardíaco anormal (prolongación del intervalo QT)
- Si está tomando Hipérico (Hierba de San Juan)

¿QUÉ COSAS DEBO SABER O HACER MIENTRAS ESTOY TOMANDO KALETRA®?

- Avise que está tomando esta medicación si tiene que atenderse con un médico, enfermero, dentista o farmacéutico.
- KALETRA® interactúa con muchas otras drogas: sus efectos adversos pueden aumentar o puede disminuir su efecto terapéutico. Chequee con su médico o farmacéutico toda la medicación que consume, sea de venta libre, producto natural o vitaminas para verificar que sea seguro tomarlos si está tomando KALETRA®.
- KALETRA® puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre (hiperglucemia); esto puede producir o empeorar una diabetes. Avise a su médico si tiene signos de hiperglucemia: confusión, somnolencia, mucha sed y hambre,

necesidad de orinar con más frecuencia, respiración rápida, aliento a frutas.

- Si tiene hemofilia avise a su médico; KALETRA® puede producir más sangrados. Realice los controles sanguíneos que su médico le indique.
- KALETRA® puede aumentar los niveles de colesterol y triglicéridos.
- Este medicamento no reduce el riesgo de transmitir el VIH a otras personas a través del contacto sexual, por compartir agujas o por estar expuestos a su sangre. Los pacientes pueden continuar experimentando enfermedades asociadas a la infección por VIH, incluyendo infecciones oportunistas. No comparta agujas ni elementos como cepillo de dientes o rasuradores.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS QUE TENGO QUE COMUNICAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE?

Si bien es raro, algunas personas pueden tener efectos adversos graves asociados a la toma de una medicación. Avise a su médico si Ud. tiene alguno de los siguientes signos o síntomas.

- Signos de una reacción alérgica (rash, urticaria, picazón, inflamación o ampollas en la piel, sibilancias, opresión en el pecho, dificultad para respirar o hablar, ronquido inusual, hinchazón de la boca, cara, labios, lengua o garganta.
- Dolor de pecho.
- Mareos o desmayos.
- Cualquier hematoma o sangrado inexplicado.
- Cambios en la grasa corporal.
- Signos de infección: fiebre, dolor de garganta, debilidad, tos, acortamiento de la respiración.
- Signos de problemas en el hígado: orina oscura, cansancio, falta de apetito, dolor de estómago, heces claras, vómitos, coloración amarillenta de la piel o de los ojos.
- Signos de problemas en el páncreas (pancreatitis): fuerte dolor de estómago, fuerte dolor de espalda, mucho malestar estomacal o vómitos.
- Un latido cardíaco acelerado o anormal

¿QUÉ OTROS EFECTOS ADVERSOS PUEDE PRODUCIR?

- Dolor de espalda
- Malestar estomacal, vómitos, diarrea
- Dolor de cabeza, mareos
- Cansancio, debilidad
- Dolor muscular o en las articulaciones.

Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se agrava o no desaparecen.

¿CÓMO SE TOMA?

Según la presentación en comprimidos que tenga, para la dosis habitual de 400/100mg cada 12 hs

- tomar 2 comprimidos cada 12 hs de la presentación 200/50mg
- tomar 4 comprimidos cada 12 hs de la presentación 100/25mg

Debe tomarse todos los días a la misma hora independientemente de la ingesta de alimentos. Si causa molestias estomacales tomar con las comidas. Tragar el comprimido entero, sin triturar, masticar o romper.

¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?

Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde; si se acuerda cerca de la próxima toma, saltee la dosis omitida y tome la que le corresponde volviendo a la dosificación habitual. **NUNCA TOME DOS DOSIS JUNTAS.** Es importante que respete los tiempos de uso que su médico le indicó.

¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenga el medicamento en su envase original. Conservar en una habitación sin humedad a temperatura ambiente. Nunca almacenar medicamentos en el baño. Mantener la medicación fuera del alcance de niños y animales. Si debe descartar la medicación consulte con su médico o farmacéutico cómo hacerlo.

¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE SOBREDOSIS?:

Hospital. A. Posadas. Bs.As.
tel: (011) 4654-6648/ 4658-7777

Prospecto Kaletra®. Industria Alemana. Venta bajo receta.

https://www.uptodate.com/contents/lopinavir-and-ritonavir-patient-drug-information?source=search_result&search=kaletra&selectedTitle=3-56