

KIVEXA® (Lamivudina 300mg – Abacavir 600mg)

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SE USA?

Es un medicamento antirretroviral que se utiliza en la terapéutica de las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

El objetivo del tratamiento con antirretrovirales es llevar y mantener la carga viral por debajo de los niveles de detección y aumentar el número de linfocitos CD4 a fin de restablecer la inmunidad y reducir el riesgo de desarrollar infecciones oportunistas. De esta forma, puede mejorarse el estado de salud.

Los comprimidos recubiertos de KIVEXA® son comprimidos combinados de dosis fija que contienen lamivudina y abacavir.

¿QUÉ DEBO COMENTARLE A MI MÉDICO ANTES DE TOMAR?

- Si es alérgico al abacavir, lamivudina o a algún excipiente.
- Si su peso es inferior a 25kg.
- Si sufre trastornos hepáticos o renales.
- Si está tomando emtricitabina. Si está tomando algún fármaco que tenga alguno de los componentes de KIVEXA®
- Toda medicación que consume, sea de venta libre, natural o vitaminas.

¿QUÉ COSAS DEBO SABER O HACER MIENTRAS ESTOY TOMANDO KIVEXA®?

- Avise que está tomando esta medicación si tiene que atenderse con un médico, enfermero, dentista o farmacéutico.
- Hágase los controles sanguíneos que le indique su médico.
- KIVEXA® puede aumentar el riesgo de ataques cardíacos. Consulte a su médico.
- Use con precaución si tiene riesgo cardiovascular: presión alta, colesterol elevado, sobrepeso, diabetes o altos niveles de azúcar en la sangre, si es fumador, si es hombre y tiene más de 40 años, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca.
- Si dejó de tomar KIVEXA® porque hizo una reacción alérgica a este medicamento, no vuelva a tomarlo.
- Consulte a su médico si puede tomar alcohol.

- Consulte a su médico si tiene dificultades para tragar.
- Este medicamento no reduce el riesgo de transmitir el VIH a otras personas a través del contacto sexual, por compartir agujas o por estar expuestos a su sangre. Los pacientes pueden continuar experimentando enfermedades asociadas a la infección por VIH, incluyendo infecciones oportunistas. No comparta agujas ni elementos como cepillo de dientes o rasuradores.
- Dígale a su médico si está embarazada o planea estarlo.
- No amamante si tiene HIV a menos que su médico le indique que puede hacerlo.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS QUE TENGO QUE COMUNICAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE?

Si bien es raro, algunas personas pueden tener efectos adversos graves asociados a la toma de una medicación. Avise a su médico si Ud. tiene alguno de los siguientes signos o síntomas.

- Signos de una reacción alérgica (rash, urticaria, picazón, inflamación o ampollas en la piel, sibilancias, opresión en el pecho, dificultad para respirar o hablar, ronquido inusual, hinchazón de la boca, cara, labios, lengua o garganta).
- Signos de problemas en el hígado: orina oscura, cansancio, falta de apetito, dolor de estómago, heces claras, vómitos, coloración amarillenta de la piel o de los ojos.
- Signos de acidosis láctica (niveles altos de ácido láctico en la sangre): sensación de mucha debilidad o cansancio, dolores musculares o calambres, problemas para respirar, dolores estomacales o vómitos, sensación de frío, mareos, ritmo cardíaco rápido o irregular.
- Signos de pancreatitis: fuerte dolor de estómago, fuerte dolor de espalda, fuerte malestar estomacal y vómitos.
- Signos de problemas renales: dificultad para orinar, orina con sangre, cambios en la cantidad de orina habitual, gran aumento de peso, hinchazón.
- Dolor u opresión en el pecho.
- Fuertes mareos o desmayo.
- Úlceras en la boca.
- Depresión.

- Debilidad y dolor muscular.
- Sensación anormal de ardor, adormecimiento y hormigueo
- Cambios en la grasa corporal.
- Signos de infección: fiebre, dolor de garganta, tos, acortamiento de la respiración.

¿QUÉ OTROS EFECTOS ADVERSOS PUEDE PRODUCIR?

- Mareos.
- Dolor de cabeza.
- Malestar general - falta de energía.
- Diarrea.
- Dolor estomacal.
- Dificultad para dormir.

Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se agravan o no desaparecen.

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TENER AL TOMARLO?

No se olvide de tomarlo. Evite la ingesta de alcohol durante su uso.

Si usted tiene o tuvo hepatitis B, debe tener precauciones adicionales.

No se recomienda el uso de este medicamento junto con emtricitabina.

¿CÓMO SE TOMA?

KIVEXA® debe tomarse siguiendo estrictamente las indicaciones médicas. Se toma una sola vez al día y puede administrarse con o sin alimentos. Tener en cuenta de tomarlo siempre a la misma hora.

¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?

Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde; si se acuerda cerca de la próxima toma, saltee la dosis omitida y tome la que le corresponde volviendo a la dosificación habitual. **NUNCA TOME DOS DOSIS JUNTAS.** Es importante que respete los tiempos de uso que su médico le indicó.

¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenga el medicamento en su envase original. Conservar en una habitación sin humedad a temperatura ambiente. Mantener la medicación fuera del alcance de niños y animales. Si debe descartar la medicación consulte con su médico o farmacéutico como hacerlo.

<https://www.uptodate.com/contents/abacavir-and-lamivudine-patient-drug-information?>