

MICOFENOLATO

¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?

Es un medicamento inmunosupresor. Se utiliza para disminuir la actividad del sistema inmune del paciente y de esta manera evitar un posible rechazo del órgano trasplantado.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS QUE TENGO QUE COMUNICAR AL MÉDICO INMEDIATAMENTE?

Si bien es raro, algunas personas pueden tener efectos adversos graves asociados a la toma de una medicación. Avise a su médico si Ud. tiene alguno de los siguientes signos o síntomas.

- Signos de una reacción alérgica (rash, urticaria, picazón, inflamación o ampollas en la piel, sibilancias, opresión en el pecho, dificultad para respirar o hablar, ronquido inusual, hinchazón de la boca, cara, labios, lengua o garganta).
- Signos de infección: fiebre, escalofríos, dolor de garganta u oídos, tos, dolor al orinar, úlceras en la boca, heridas que no cicatrizan.
- Signos de hiperglucemia (niveles altos de azúcar en la sangre): confusión, somnolencia, mucha sed y hambre, orinar con más frecuencia, respiración rápida, aliento a frutas.
- Dolor de pecho
- Latidos cardíacos rápidos o lentos
- Fuerte dolor de cabeza
- Hematomas (moretones) o sangrado
- Gran pérdida de peso
- Sensación de debilidad o cansancio
- Heces alquitranadas, negras o con sangre
- Vomitar sangre o algo similar a granos de café
- Sensación anormal de ardor, adormecimiento y hormigueo.
- Cambios en el color o tamaño de un lunar
- Abultamiento o crecimiento de la piel
- Fuertes mareos o desmayos
- Sudores nocturnos
- Diarrea severa
- Mucho malestar estomacal y vómitos
- Mucho dolor de panza
- Hinchazón de brazos o piernas
- Palidez
- Manchas blancas en la boca

- Prurito o flujo vaginal
- Coloración amarillenta de piel u ojos

¿QUÉ OTROS PROBLEMAS PUEDE PRODUCIR EL MICOFENOLATO?

- Diarrea (heces blandas) / constipación (heces duras)
- dolor de estómago
- vómitos
- dificultad para dormir
- dolor, especialmente en la espalda, los músculos o las articulaciones
- temblor/ inestabilidad
- dolor de cabeza
- mareos
- falta de apetito

Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se agravan o no desaparecen.

¿CÓMO SE TOMA?

El micofenolato debe tomarse siguiendo las indicaciones médicas. Dependiendo el paciente puede indicarse cada 24 hs – 12 hs o cada 8 hs.

La presentación de micofenolato es como micofenolato mofetilo (Cellcept®) en cápsulas de 250mg y en comprimidos de 500mg y como micofenolato sódico (Myfortic®) en comprimidos recubiertos de 180 mg y 360 mg.

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TENER AL TOMARLO?

Tome el micofenolato con el estómago vacío (1 hora antes o 2 horas después de las comidas) y siempre aproximadamente a la misma hora todos los días. No administrar en forma conjunta con soluciones antiácidas que contengan aluminio o magnesio. Siga cuidadosamente las instrucciones de la receta y pídale a su médico o farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda.

Ud puede tener más posibilidades de infecciones; Lávese las manos con frecuencia; manténgase alejado de personas con infecciones, resfríos o gripe.

El uso de micofenolato durante el embarazo puede producir efectos adversos en el feto; Evite los embarazos durante el tratamiento con micofenolato.

Avise a su médico si está tomando colestiramina (Questran®), norfloxacin, metronidazol, rifampicina.

Si abre las cápsulas, evite el contacto con el polvo; si toma contacto con el polvo o si éste entra en sus ojos, lávese las manos y los ojos inmediatamente.

¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?

Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde; si se acuerda cerca de la próxima toma, saltee la dosis omitida y tome la que le corresponde volviendo a la dosificación habitual. NUNCA TOME DOS DOSIS JUNTAS. Es importante que respete los tiempos de uso que su médico le indicó.

¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenga el medicamento en su envase original. Conservar en una habitación sin humedad a temperatura ambiente. Mantener la medicación fuera del alcance de niños y animales. Si debe descartar la medicación consulte con su médico o farmacéutico cómo hacerlo.

<https://www.uptodate.com/contents/mycophenolate-patient-drug-information?>