

## **POSACONAZOL**

### **¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?**

El posaconazol es un antimicótico. Este medicamento se utiliza para prevenir las infecciones producidas por hongos, o para tratar infecciones micóticas existentes.

En los pacientes trasplantados el sistema inmune está deficiente y por ellos son más propensos a contraer infecciones.

### **¿CÓMO SE UTILIZA?**

- El posaconazol inicialmente se indica 3 veces al día.
- La dosis estándar es de 200mg (5ml de suspensión). La presentación que disponemos en el país es en forma de suspensión – considerar agitar bien la suspensión antes de administrarla.
- Su administración debe ser siempre a las mismas horas y debe ser junto con una comida rica en grasas o hasta 20 minutos después de haber ingerido una comida rica en grasas; de esta manera se optimiza su absorción.

### **¿QUÉ PROBLEMAS PUEDE PRODUCIR?**

La toma de este medicamento puede generar:

- Diarrea, náuseas, vómitos, anorexia
- Dolor abdominal
- Constipación
- Modificación en los valores de potasio, fósforo
- Hipertensión
- Arritmias
- Alteraciones hepáticas
- Tos-disnea (dificultad para respirar)
- Disminución del número de glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina y plaquetas

Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se agravan o no desaparecen.

### **¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TENER AL TOMARLO?**

Recuerde tener una dieta rica en grasas para optimizar la respuesta del medicamento. Es un medicamento que su médico va a seguir de cerca para eventuales cambios de dosificación según la respuesta de su organismo al fármaco.

Avísele a su médico si Ud está tomando alguno de estos fármacos: atorvastatina, simvastatina, ergotamina, ergonovina, quinidina o sirolimus ya que el Posaconazol puede aumentar los niveles en sangre de estos fármacos produciéndose toxicidad.

### **¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?**

Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde; si se acuerda cerca de la próxima toma, saltee la dosis omitida y tome la que le corresponde volviendo a la dosificación habitual. NUNCA TOME DOS DOSIS JUNTAS. Es importante que respete los tiempos de uso que su médico le indicó.

### **¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR ESTE MEDICAMENTO?**

Mantenga el medicamento en su envase original. La medicación cerrada conservarla en una habitación sin humedad a temperatura ambiente; una vez abierto conservar en la heladera. Mantener la medicación fuera del alcance de niños y animales. Si debe descartar la medicación consulte con su médico o farmacéutico como hacerlo.

<http://www.uptodate.com/contents/posaconazole-drug-information>

07/2015

Farmacia – POSACONAZOL