



Signos de alarma

- Irritación o infección alrededor del ostoma: valorar coloración, presencia de secreciones, pérdida de líquido, enrojecimiento.
- Obstrucción: dificultad al administrar alimentación o medicación, SIEMPRE LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- Salida accidental del botón: evitar tironear del mismo, el peso en las tubuladuras, adecuar conexiones.
- Otros síntomas: diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento, distensión abdominal post alimentación.

Acudir de inmediato a la guardia más cercana

Cualquier consulta comunicarse al:

0230-4482563/2568.

Ante una emergencia dirigirse a la guardia del Hospital Universitario Austral



Cuidados para el alta en el Paciente con Gastrostomía

Unidad de Cuidados Críticos Pediátricos

Alimentación

- Formas de administrar la alimentación: continua (por bomba) o intermitente (por gravedad).
- Mantener al niño semisentado en el momento de la administración.
- Si es por gravedad, la altura de la jeringa no debe pasar la cabeza del niño, eso permitirá el descenso gradual del alimento y no de manera rápida.
- Utilizar los conectores adecuados a cada sistema.
- Al finalizar la toma, pasar agua para mantener la permeabilidad del conducto.
- Utilizar la tubuladura para descomprimir antes de administrar la alimentación/medicación.

Limpieza de tubuladuras

- Sumergir la tubuladura en detergente enzimático con agua fría durante 3 a 5 minutos.
- Despegar los restos de la tubuladura lavando con la jeringa de tumey.
- Enjuagar con agua destilada.
- Realizar el secado con gasas estériles, dejar que seque (no guardar húmeda).
- Realizar el procedimiento cada 6 horas cuando se cambia el set de alimentación, o cada vez que se pase la alimentación o medicación.

Medicación

- Se puede administrar medicamentos líquidos como jarabes.
- Si la medicación es en comprimidos, se deberá triturar y diluir en una pequeña cantidad de agua.
- Luego de cada pasaje, se deberá administrar agua para limpiar el conducto.
- NO administrar medicamentos que no estén bien diluidos.

Higiene y cuidados peristoma

- Se realizará la limpieza diariamente, luego del baño.
- Se mantendrá la zona limpia y seca durante el día.
- Se colocará una gasa para evitar apoyo del dispositivo sobre la piel.
- Valorar diariamente el sitio peri inserción.

