

Atención de Donantes

CONSEJOS POST DONACION

En el día de hoy siga estos consejos:

- No se retire hasta que se sienta bien y haya tomado su refrigerio.
- No fume ni beba alcohol durante una hora.
- Si cumple tareas de riesgo (trabajo en andamios o altura, conductor, etc.), es aconsejable esperar una hora antes de reiniciar la tarea.
- Si se produce un hematoma en la zona de punción coloque hielo, puede tomar analgésicos si duele, tardará alrededor de 7 días en desaparecer.
- Si dentro de los 3 días posteriores a su donación contrae alguna enfermedad, avísenos telefónicamente.
- Puede volver a donar sangre en 2 meses sin ningún daño para su salud.
- Si usted es donante de plaquetas, no debe consumir aspirinas, sí ibuprofeno o paracetamol.

Ante cualquier duda, por favor consúltenos.
Al tel. 0230-4482015/0230-4482925.

Atención de Donantes

CONSEJOS POST DONACION

En el día de hoy siga estos consejos:

- No se retire hasta que se sienta bien y haya tomado su refrigerio.
- No fume, ni beba alcohol durante una hora.
- Si cumple tareas de riesgo (trabajo en andamios o altura, conductor, etc.) es aconsejable esperar una hora antes de reiniciar la tarea.
- Si se produce un hematoma en la zona de punción coloque hielo, puede tomar analgésicos si duele, y tardará alrededor de 7 días en desaparecer.
- Si dentro de los 3 días posteriores a su donación contrae alguna enfermedad, avísenos telefónicamente.
- Puede volver a donar sangre en 2 meses sin ningún daño para su salud.
- Si usted es donante de plaquetas no debe consumir aspirinas, sí ibuprofeno o paracetamol.

Ante cualquier duda, por favor consúltenos.
Al tel. 0230-4482015/0230-4482925.