

Preparación para Rectosigmoideoscopia

- A efectuar por la mañana (hasta las 12:00 hs.):

Debe realizarse un enemol la noche anterior antes de acostarse, después de haber cenado normalmente. Luego, sólo puede ingerir líquidos claros. A la mañana siguiente, a las 07:00 hs., debe efectuarse otro enemol. Puede desayunar solamente líquido. No tomar café ni leche.

- A efectuar por la tarde (a partir de las 13:00 hs.):

Debe realizarse un enemol la noche anterior antes de acostarse, después de haber cenado normalmente. Luego, sólo puede ingerir líquidos claros. A la mañana siguiente, puede desayunar solamente líquido, y a las 11:00 hs., debe efectuarse otro enemol. No tomar café ni leche.

Su turno es el día.....a lashs.

Avenida Juan Domingo Perón 1500
(1629) Pilar, Buenos Aires, Argentina

Teléfono (0230) 448-2000
www.hospitalaustral.edu.ar

Preparación para Rectosigmoideoscopia

- A efectuar por la mañana (hasta las 12:00 hs.):

Debe realizarse un enemol la noche anterior antes de acostarse, después de haber cenado normalmente. Luego, sólo puede ingerir líquidos claros. A la mañana siguiente, a las 07:00 hs., debe efectuarse otro enemol. Puede desayunar solamente líquido. No tomar café ni leche.

- A efectuar por la tarde (a partir de las 13:00 hs.):

Debe realizarse un enemol la noche anterior antes de acostarse, después de haber cenado normalmente. Luego, sólo puede ingerir líquidos claros. A la mañana siguiente, puede desayunar solamente líquido, y a las 11:00 hs., debe efectuarse otro enemol. No tomar café ni leche.

Su turno es el día.....a lashs.