

Instrucciones de seguimiento ambulatorio para pacientes con traumatismo de cráneo leve

Instrucciones seguimiento ambulatorio traumatismo de cráneo leve 11/2014

No hemos encontrado evidencia de que su traumatismo de cráneo no sea grave. Sin embargo, se pueden presentar ciertos síntomas en horas o, aún, en días después. Así, las primeras 24 horas son importantes, por eso Ud. debe permanecer junto a un acompañante confiable durante este período. Si cualquiera de los siguientes síntomas se presenta, deberá concurrir nuevamente a la consulta médica a la brevedad.

- Somnolencia o dificultad cada vez mayor para despertar al paciente (despierte al paciente cada dos horas durante el sueño).
 - Náuseas y vómitos.
 - Movimientos espontáneos anormales o convulsiones.
 - Salida de líquido acuoso o sanguinolento por nariz u oído.
 - Dolor de cabeza que no cede y no calma con analgésicos.
 - Debilidad o pérdida de sensibilidad del brazo o pierna.
 - Confusión o conductas extrañas.
 - Cambios en la forma de respirar (que respire muy rápido).
 - Pulso muy rápido o muy lento.
 - Pupila (parta negra del ojo) más grande que la otra.
 - Movimientos raros de los ojos o visión doble o alteraciones en la visión.
- * Si nota hinchazón en el sitio del golpe aplique hielo, asegurándose de poner una toalla entre el hielo y la piel.
 - * Si la hinchazón aumenta, a pesar del hielo, realice una consulta médica.
 - * No ingiera bebidas alcohólicas al menos por una semana posterior al traumatismo.
 - * No tome sedantes u otras medicaciones fuera de los prescritos por sus médicos.

Números de Contacto: 0230-448-2000

Instrucciones de seguimiento ambulatorio para pacientes con traumatismo de cráneo leve

Instrucciones seguimiento ambulatorio traumatismo de cráneo leve 11/2014

No hemos encontrado evidencia de que su traumatismo de cráneo no sea grave. Sin embargo, se pueden presentar ciertos síntomas en horas o, aún, en días después. Así, las primeras 24 horas son importantes, por eso Ud. debe permanecer junto a un acompañante confiable durante este período. Si cualquiera de los siguientes síntomas se presenta, deberá concurrir nuevamente a la consulta médica a la brevedad.

- Somnolencia o dificultad cada vez mayor para despertar al paciente (despierte al paciente cada dos horas durante el sueño).
 - Náuseas y vómitos.
 - Movimientos espontáneos anormales o convulsiones.
 - Salida de líquido acuoso o sanguinolento por nariz u oído.
 - Dolor de cabeza que no cede y no calma con analgésicos.
 - Debilidad o pérdida de sensibilidad del brazo o pierna.
 - Confusión o conductas extrañas.
 - Cambios en la forma de respirar (que respire muy rápido).
 - Pulso muy rápido o muy lento.
 - Pupila (parta negra del ojo) más grande que la otra.
 - Movimientos raros de los ojos o visión doble o alteraciones en la visión.
- * Si nota hinchazón en el sitio del golpe aplique hielo, asegurándose de poner una toalla entre el hielo y la piel.
 - * Si la hinchazón aumenta, a pesar del hielo, realice una consulta médica.
 - * No ingiera bebidas alcohólicas al menos por una semana posterior al traumatismo.
 - * No tome sedantes u otras medicaciones fuera de los prescritos por sus médicos.

Números de Contacto: 0230-448-2000