






## EPP para prácticas de **bajo riesgo** en pacientes con sospecha de COVID 19 o con COVID 19 positivo

| Secuencia de Colocación de EPP<br>(afuera de la habitación)  |  |
|--|--|
| 1-Higiene de manos.  | Previo a la higiene de manos retirarse accesorios (cadenas, anillo, reloj)<br>Realizar la higiene de manos con alcohol en gel siguiendo los 9 pasos.   |
| 2-Colocarse barbijo quirúrgico<br>    | Tener en cuenta <ul style="list-style-type: none"><li>• Colocación correcta</li><li>• Ajuste nasal</li><li>• Deslizar sobre mentón y chequear ajuste del barbijo.</li><li>• Tiras de barbijo ajustar arriba y abajo, no cruzadas</li></ul> |
| 3- Colocarse antiparras<br>           | Las antiparras se deberán utilizar en todo momento.  |
| 4- Colocarse camisolín común.<br>    | No olvidar atarlo a la altura del cuello, hombros y cintura.   |
| 5- Colocarse guantes (manoplas)<br> | Se colocaran sobre el puño del camisolín y deberán cambiarse al realizar procedimientos.   |

## Secuencia de retiro de EPP

### Dentro de la habitación

1 - Retirar par de guantes.



Recordar que por fuera están contaminados  
Retirar el guante con la mano opuesta  
Retener el guante retirado en la mano que aún no se extrajo el guante.  
Colocar los dedos por debajo de los guantes a la altura de la muñeca y retirarlo  
Descartar en bolsa roja.

2. Higiene de manos

Realizar la higiene de manos con alcohol en gel siguiendo los 9 pasos.

3 - Retirar camisolín



El frente y las mangas del vestido están contaminados

- Desabroche los lazos del camisolín, cuidando que las mangas no entren en contacto con su cuerpo al alcanzar los lazos
- Retire el camisolín del cuello y los hombros, tocando solo la parte interior del camisolín
- Voltee el camisolín al revés
- Doblar o enrollar en un paquete y desechar en un contenedor de residuos con bolsa roja
- Si sus manos se contaminan durante el retiro del camisolín, inmediatamente lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol

4 - Retirar barbijo quirúrgico y descarto




¡Recordar que por fuera está contaminado – NO SE DEBE TOCAR!  
Desatar de las tiras y luego retirarlo  
Descartar en bolsa roja.

5 – Higiene de manos y salir de la habitación

Realizar la higiene de manos con alcohol en gel siguiendo los 9 pasos.

### Fuera de la habitación

6 –Dirigirse al chatero, retirarse las antiparras y dejarlas en el contenedor para su procesamiento



Recordar que por fuera están contaminados.  
Para retirarlos sujetarlos de las patillas que se encuentran más limpias.  
Dejarla dentro del recipiente para material contaminado  
Si sus manos se contaminan durante la eliminación de gafas lávese inmediatamente o use un desinfectante para manos a base de alcohol.  
La auxiliar de enfermería procederá a:  
Limpieza y desinfección con Amonio Cuaternario (Surfanios/espuma)

7 – Higiene de manos

Realizar la higiene de manos con alcohol en gel siguiendo los 9 pasos.